よこて店

今月の農作器

県病害虫防除所発表より 一部抜粋

【本田防除…6月15 日前後)。 斑点米カメムシ類の発生時期は早く 葉いもちの感染量はやや少ない見込み

ら落水・中干し管理とする。 望ましく、目標係数の8割を確保した 発生量はやや多いと予想されるため、 田や農道・畦畔の除草を徹底する。 分げつ期には浅水管理や間断潅水が 水

リムシ、モンシロチョウの発生量が多い予 にく・玉ねぎ等のサビ病など、 例年 同様 注意が必要である。 またヨトウガやネキ ねぎのべと病、キュウリの黒星病、にん いずれも初期防除を的確に行う。

る(酸素供給剤の施用もおすすめ→)。 湿にも注意して根痛みの無いよう管理す 防除が最も有効になる。土壌の乾燥・過 これからの時期、予防散布や耕種的

6月の当店おすすめ商品!!!

・水稲調整肥(青すぎる場合=未消化窒素の消化) **マグ25**(20kg)¥1,850 (無効分けつの調整等に)

樹カメムシ類やナミハダニが多い予想。 間隔で防除を実施する。また全般に く場合や発生が見られた園地では10 多い予想。 りんごのモニリア病、 。見つけ次第除去し、降雨が続 なしの黒星病が

最適な剤をお薦めしたいと思う。

旬までに済ませる(果実肥大の促進と、 ヶ月後)まで、なしは5月下旬~6月初 隔年結果を防ぐ為)。 粗摘果は、りんごは6月上旬 (開花1

ビターピット、サビ等の症状が散見され 葉面散布と土壌施用も合わせて行う事 マ被害)やりんごの赤斑(カメムシ被害)、 た。農薬散布時には適期適量散布に加 カルシウム不足が懸念される園地では また昨年はぶどうのサビ症状(アザミウ 、薬剤選びも今一度ご考慮頂きたい。



PK7732 (20kg) ¥2,665 (土壌養分の有効活用) **エスアイ加里** (20kg) ¥2,855 ・酸素供給剤(根痛み防止=根域の過温防止に ネオカルオキソ(緩効性) (10kg) ネハリエース(速効性) (10kg) ¥3,500 M.O.X(液状・超速効性) (10L) ¥3,500

とい己にし難草対策

定休日:日曜祝日

営業時間

H30.6.4 vol.42

8時半~17時半 (土曜は17時まで)

5葉期まで(2週間の残効あり)、液剤は**7** たトドメMF(メタミホップ)。1㎏粒剤は のと合わせ、今後の除草について補足する。 少なくない。後発ノビエの新剤が登場した 困難で、気付いたら草だらけということも 点も多い。特に大規模農家は圃場管理が なる 一方で、1 町歩区画の雑草防除は難 :を合言葉に満を持して登場し 「ノビエは、もう枯れている」 新剤 基盤整備が進み 田植えや稲刈りは楽に

トドメMF

登場!

|中・後期剤の使用について

していく予定なのでお楽しみに・・・♪

できるのが 面白い。 効果のほどは今後の使 葉期までの適用で湛水でも落水でも散布

用結果や試験状況を元に、皆さんに周知

判断する必要がある。当方にご相談頂いけ を加味し、どの草がどう残っているかから ては、移植日、薬剤使用状況、圃場状態等 ある。その為、薬剤選びと散布時期につい モダカ、クログワイ等が残るケースも多々 草が繁茂したり、枯れにくいホタルイやオ てしまうと除草効果が落ちるため後発雑 エのみ)を使うしかない。また田面が 一旦出 ず、それまで待つかクリンチャー粒剤(ノビ 中・後期剤は移植15 日前後まで使用でき に次の剤を使うべきだろう。が、ほとんどの なら 一発剤が効かない可能性が高く早め れないし、最近生えた物や大きくなった物 で生えていた物なら 一発剤で枯れるかもし れる圃場では、どのタイミングで次の剤を 使うかお悩みの方が多い。 |発剤使用時点 |発剤散布後にノビエやホタルイが見ら

0

編集者

ホーラー 120 掘り出し物 Cm

★東北地方の1ヶ月天気米

6/257/1

の日が多い予想です。 い確率が40%となっ 2週目は平年並か高 り、後半は曇りや雨 は数日の周期で変わ ています。 目は高い確率80%、 週別の気温は、1週 期間の前半は天気

や気温の高低差が大変わりやすい天気

は十分気を付けましょう! きい昨今です。人も作物も健康管理に 20 30 50 降水量 日照時間 30 ■並 ■高い ■(平年)以下 (%)

※本紙面に掲載の商品価格は「税抜き価格」です。

がやってきました。圃場で雑草が目に

水稲除草について頭を悩ませる季節 のつぶやき・・・

ドの農家さん(元々圃場条件が悪い)も さんが多い中、初めからあきらめムー 入ると居ても立っても居られない農家

んなことを聞き取り、それぞれに合っ いらっしゃいます。農家さんからいろ

た剤選びに苦慮する毎日です…。