

スギナに対してサンダーボルト007はRM 除草剤と同等の効果が認められました

1. サンダーボルト007の殺草効果と抑草期間

試験区\項目	殺草効果(処理後日数)				抑草期間 (日)
	発現日数	完成日数	再生発現	程度	
試験区 サンダーボルト007	2	15	90	+++	90
対照区 除草剤 RM	7	15	90	+++	90
試験概要	1. 散布日 平成 25 年 6 月 5 日 2. 薬量 40mℓ 3. 水量 2ℓ (50 倍希釈)				
**殺草効果の程度	- 効果がない ± 効果は極めて小さい + 殺草効果は葉の一部に見られるが葉全体に及ばない ++ 殺草効果は葉で著しいが茎までは及ばない +++ 殺草効果は株全体に及ぶ × 株が枯死し、再生は見られない				

2. 散布後の殺草効果の推移

1. 平成 25 年 6 月 5 日 (散布当日)



左：対照区 除草剤 RM
右：試験区 サンダーボルト 007

2. 平成 25 年 6 月 8 日 (散布 3 日後)



試験区のスギナが変色し始めているが対照区に変化は見られない

3. 平成 25 年 6 月 20 日 (散布 15 日後)



両区ともスギナは枯れあがっている

4. 平成 25 年 10 月 8 日 (散布 125 日後)



9 月中旬から草の再生が始まるが、抑草に差は認められない